

## Cas pràctic


### Creació de la Unitat del dolor agut. Corporació Sanitària Parc Taulí

Preparat per:

Carmen Díaz, directora d'infermeria; Josep Lluís Solas, cap d'infermeria de l'àrea quirúrgica; Montserrat Solà, infermera de la Unitat del dolor agut; Bárbara Méndez, metgessa anestesista adjunta del Servei d'anestesiologia i responsable de la Comissió del dolor agut; Francisca Gordo, metgessa anestesista adjunta del Servei d'anestesiologia i responsable de la Comissió del dolor agut; Carme Colillas, directora del Servei d'anestesiologia i reanimació.

Presentat per:

Montserrat Solà, infermera de la Unitat del dolor agut



**Parc Taulí Sabadell**  
Hospital Universitari

# INFERMERIA A UDA

# UNITAT DOLOR AGUT

Inici 2005.  
Només anestèsia



2007  
Hospitalització rep pacients amb poca morfina  
ev o anestèsic local per catèter peridural  
Infermeria temps parcial (2-3h) amb anestesista



2012  
Infermeria temps complet  
Autonomia en les visites als pacients amb suport  
anestesista

**Benchmarking  
Infermeria  
La Unió**

# UNITAT DOLOR AGUT

## Visites

- Hospitalització i SEMIS
- Amb dispositiu o no


## Formació i assessorament

- A personal hospitalització, URPA
- A anestèsia

## Base de dades

- En 3 anys >6000 pacients introduïts
- Anàlisi per procediment i/o analgèsia

# BASE DE DADES



Parc Taulí Sabadell  
Hospital Universitari




## PROCEDIMENT QUIRÚRGIC

### TIPUS D' ANALGÈSIA : PRINCIPAL I DE RESCAT



# BASE DE DADES



Parc Taulí Sabadell  
Hospital Universitari



TIPUS DE BLOQUEIG  
ANESTÈSIC ADMINISTRAT  
DURACIÓ BLOQUEIG

DOSI ANALGÈSIA ADMINISTRADA

MG.MÒRFIC/ML.ANESTÈSIC LOCAL




24/48 H

REPÒS/MOVIMENT

# BASE DE DADES






## EFFECTES ADVERSOS



**HIPOTENSIÓ**


**BLOQUEIG EEII**









## CASOS VISITATS UDA






## EVA MODERAT-INTENS


— 2013 — 2014 — 2015




## EFFECTES ADVERSOS PCA MORFINA EV




## EFFECTES ADVERSOS PERIDURAL





## EFFECTES ADVERSOS ELASTÒMER

— 2013 — 2014 — 2015






Institut Català  
de la Salut




EVA  $\leq$  3



Parc Taulí Sabadell  
Hospital Universitari



EVA  $\leq$  3



# TRAUMATOLOGIA


- PTG
- PRÒTESI ESPATLLA SENSE BLOQUEIG
- ARTRODESI LUMBAR

2013  
1443 casos

- 24H REPÒS 22,9%(331 casos)
- 24H MOV. 28,6%(414 casos)

2014  
1075 casos

- 24H REPÒS 15,8% (170 casos)
- 24H MOV. 22% (340 casos)



2014

206 casos

- 24h REPÒS 111 casos (54%)
- 24h MOV. 117 casos (57%)

2015

184 casos

- 24h REPÒS 64 casos (35%)
- 24h MOV. 88 casos (48%)



# GINECOLOGIA

HISTERECTOMIA PFANNENSTIEL

HISTERECTOMIA LAPAROTOMIA

2013


59 casos

- 24H REPÒS  
20,3%(12 casos)
- 24H MOV. 37,28%  
(22 casos)

2014

90 casos

- 24H REPÒS  
11,1%(10 casos)
- 24H MOV. 36,6%(33 casos)




2014  
24 casos

- 24H REPÒS 7 casos (29%)
- 24H MOV. 10 casos ( 42%)

2015  
26 casos

- 24h REPÒS 5 casos (19%)
- 24h MOV. 8 casos (31%)



**Parc Taulí Sabadell**  
Hospital Universitari

