

La Unió Catalana d'Hospitals valora positivament el Pla de Govern per millorar l'atenció sanitària i sociosanitària dels ciutadans

15:55 05.09.2013

Barcelona (ACN).- La Unió Catalana d'Hospitals considera que la proposta d'abordatge conjunt i cooperatiu dels departaments de Salut i Benestar social i família "suposarà una gran millora per a la qualitat en l'atenció assistencial dels ciutadans" segons han explicat aquest dijous amb un comunicat. A més, l'entitat vol remarcar que "les previsions d'envelliment de la població i l'augment de les malalties cròniques fan que aquest abordatge comú sigui més necessari que mai". La directora general de la Unió, Helena Ris, considera que "aquesta actuació facilitarà l'optimització de recursos ja existents i significarà més qualitat assistencial per al ciutadà i més eficiència per al sistema".

Según ha explicado el psiquiatra e investigador de FIDMAG Salvador Sarró, "este hallazgo desmonta la hipótesis de que los síntomas de la Discinesia Tardía son un mero reflejo de los efectos neuroquímicos de los antipsicóticos, ya que son la consecuencia de un cambio en la morfología del cerebro".

Los responsables del estudio consideran que los resultados de la investigación se deberían tener en cuenta a la hora de desarrollar nuevos fármacos antipsicóticos.

"Es importante buscar medicamentos que reduzcan al mínimo el riesgo de provocar esta síndrome, como es el caso de la clozapina", ha indicado el investigador.

Pese a ello, Sarró ha aconsejado que las personas con esquizofrenia y DT, cuyo tratamiento incluya el uso de fármacos antipsicóticos, no dejen de consumirlos.

"Estos medicamentos ayudan a controlar el desarrollo de la propia enfermedad, permitiendo que la mayoría de las personas con esquizofrenia puedan llevar una vida normal fuera del hospital", ha afirmado el psiquiatra.

En la investigación participaron 81 personas con esquizofrenia de distintos dispositivos asistenciales de las Hermanas Hospitalarias.

El equipo investigador, liderado por la doctora Edith Pomarol-Clotet, examinó y comparó, mediante una prueba de resonancia estructural, el cerebro de 32 pacientes con discinesia tardía con 49 sin esta alteración y también se incluyeron 61 controles a personas sanas.

Los resultados se examinaron con una técnica de resonancia magnética, la volumetría basada en vóxeles (VBM), que permite detectar los cambios en el volumen de la sustancia gris que se producen en las distintas zonas del cerebro.

Tras el análisis, se observaron modificaciones en la morfología de los ganglios basales -núcleos localizados en la profundidad del cerebro que tienen un papel importante en el control de los movimientos- de las personas con Discinesia Tardía.

El estudio muestra que los pacientes con este síndrome presentan reducciones en el volumen de la sustancia gris, a nivel predominantemente subcortical, localizadas en mayor medida en el núcleo caudado (uno de los tres grandes núcleos que componen los ganglios de la base).

También se constata que el volumen de los ganglios basales del grupo de pacientes con TD es menor, hecho que señala una pérdida de tejido asociada con este fenómeno.

La esquizofrenia es un trastorno mental crónico y grave que, en España, afecta a unas 400.000 personas.

Se trata de una enfermedad cuyos síntomas suelen aparecer en adultos jóvenes. En el caso de los hombres se hace visible entre los 18 y los 25 años, mientras que entre las mujeres se retrasa al período de entre 23 y 35 años.