

### **Títol de l'experiència**

Ús de fotografies per generar una necessitat de formació en lesions cutànies

### **Autors**

Josefa Valls Matarín

Mercedes del Cotillo Fuente

Inmaculada Sandalinas Mulero

### **Comunicació oral**

Josefa Valls

[Tel:639454474](tel:639454474)

**Correu electrònic:** [finavalls@gmail.com](mailto:finavalls@gmail.com)

Hospital Universitari Mútua Terrassa

## Ús de fotografies per generar una necessitat de formació en lesions cutànies

**Introducció:** Les lesions relacionades amb la dependència és un nou paradigma proposat pel Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas que engloba 7 tipus de lesions de diferent etiologia entre les que es troben les úlceres per pressió (UPP) i les lesions cutànies associades a la humitat. (LESCAH).

**Idea innovadora:** L'ús de fotografies podria ser una eina per avaluar els coneixements, sensibilitzar a les infermeres i fer visible aquest nou model de classificació de lesions cutànies.

**Transformació de la idea en acció:** Es va realitzar un qüestionari amb 14 fotografies validades per experts. Aquestes fotografies no s'acompanyaven de text explicatiu i mostraven pell de la zona sacra i glútia amb UPP Categoria I, II,III (2 imatges de cada), categoria IV (1 imatge) i LESCAH (7 imatges).

Les fotografies es mostraven en suport informàtic, individualment i sense límit de temps. La participació va ser voluntària.

El qüestionari constava de 14 preguntes amb la identificació del número de fotografia amb 6 opcions de resposta: a) lesió per pressió categoria I, b) lesió per pressió categoria II, c) lesió per pressió categoria III, d) lesió per pressió categoria e) lesió per humitat i f) no ho sé. També es van recollir dades demogràfiques, anys d'experiència professional, i coneixement del sistema de classificació de les UPP.

**Resultats obtinguts:** Van participar 56 infermeres (98,5% del personal). La mitjana d'experiència professional va ser de 12,9 (DE=7,5) anys. El 98,2% coneixia el sistema de classificació de les UPP. Es van classificar correctament el 64,8% (IC95% 60,0-69,3) de les LESCAH i el 69,1% (IC 95% 64,3- 73,5) de les UPP. Un 35,2% de les LESCAH es van considerar com UPP principalment de categoria II (18,9%). El 14,8 % de les UPP es van diagnosticar com a LESCAH i el 16,1 % en altra categoria. La concordància entre infermeres va obtenir un índex Kappa global de 0,38(IC95%:0,29 a 0,57).

**Conclusions:** Les infermeres tenen dificultats per diferenciar UPP i LESCAH, sobretot en categories inicials. Tenen la percepció de conèixer el sistema de classificació de les UPP, però no les classifiquen correctament. El grau de concordància en el diagnòstic de les lesions cutànies és baix, fet que pot provocar variabilitat en la prevenció i el tractament d'aquestes lesions.

L'estratègia de mostrar imatges per avaluar els coneixements va generar interès i curiositat per conèixer els resultats i la necessitat de formació entre els professionals. Aquesta eina ha estat el motor motivacional per realitzar un curs formatiu sobre el tema, ja que permet al professional detectar les seves mancances de manera ràpida.