

Mesures de protecció d'infecció de la Covid-19

Àmbits	Situació	Mascareta quirúrgica	Mascareta FF2 o FF3	Guants de nitril o làtex	Bata impermeable de màniga llarga o davantal de plàstic	Ulleres o pantalla facial	Bata d'un sol ús
Atenció en qualsevol centre de salut d'atenció primària i atenció especialitzada d'aguts (1)	Personal que atengui casos en investigació, probables o confirmats per infecció pel coronavirus SARS-CoV-2	✓ Ús tot el dia	×	✓	×	×	✓
	Maniobres amb risc d'esquitxada (higiene, aspiració de secrecions, possible contacte amb fluids, neteja de superfícies)	×	✓	✓	✓	✓	×
	Procediments que generen aerosols (sobre la via aèria, com intubació traqueal, rentat broncoalveolar o ventilació manual)	×	✓	✓	✓	✓	×
Atenció Domiciliària (2 i 3)	Visita de l'equip d'atenció primària per a casos amb probabilitat que infecció per COVID-19 (2)	×	✓	✓	×	×	✓
	Tasques del professional sanitari que impliquin risc d'esquitxades (2)	×	✓	✓	✓ Un sol ús	✓	×
	Visita Serveis d'atenció a domicili (SAD) social (3) o visita com a pacient programa ATDOM no infectats (2)	✓	×	✓	×	×	×
Atenció intermèdia (4)	Personal sanitari per a casos en investigació, probables o confirmats per infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 o les persones que entren a l'habitació d'aïllament	✓ Ús tot el dia	×	✓	×	×	✓
	En cas de realitzar tasques que impliquin risc d'esquitxades o generen aerosols	×	✓	✓	✓	✓	×
Serveis de salut mental i addiccions (5)	Atenció a pacients que acudeixin per patologia respiratòria o per altres patologies no demorables (descompensació d'una patologia crònica o cures i procediments que s'han de seguir realitzant).	✓ Ús tot el dia	×	✓	×	×	✓
	Atenció domiciliària intensiva (ADI) i hospitalització domiciliària	×	✓	✓	×	×	✓
Residències(6)	Atenció a persones COVID 19 positives o amb simptomatologia suggestiva	×	✓	✓	✓	✓	✓

Referències a protocols i guies oficials de la Generalitat de Catalunya.

1. [Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2. Actualitzat a 2/04/20 Agència de Salut Pública de Catalunya](#)
2. [Guia d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 a l'atenció primària i a la comunitat. 20/03/20 Servei Català de la Salut](#)
3. [Mesures de protecció i d'actuació per als professionals del servei d'atenció a domicili \(SAD\) 19/03/20. Departament de Treball, Benestar Social i Família.](#)
4. [Guia d'actuació a centres d'atenció intermèdia. 4/04/20 Servei Català de la Salut.](#)
5. [Guia d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 als serveis de salut mental i addiccions. 6/04/20. Servei Català de la Salut.](#)
6. [Pla d'acció per la gestió de persones en l'àmbit residencial i l'assistència sanitària en situació de pandèmia per COVID-19. 10/04/20. Servei Català de la Salut.](#)

Algunes mesures de desinfecció:

- ✓ Guants: canviar guants després de cada pacient i neteja de mans amb solució hidroalcohòlica abans i després del canvi de guants.
- ✓ Ulleres: desinfectar després de l'assistència al pacient. Es poden rentar amb aigua i sabó i alcohol etílic però per domicili també es recomana l'opció de rentar després de cada visita amb unes tovallolletes de derivats d'amonis quaternaris. Hi ha dos tipus les Tovallolletes Meliseptol (Braun) o les Tovallolletes Clinell (Vesimin)
- ✓ En visites al domicili i també a les residències, després de l'assistència al pacient, l'equip de protecció individual que usi el personal sanitari es retirarà a l'interior de l'habitació a excepció de les ulleres i la mascareta, que es retiraran fora d'aquesta. Les ulleres i la màscara s'introduiran en una bossa que es tancarà i es portaran de tornada al centre de salut del qual depengui l'equip i es desinfectarà o s'eliminarà com a residu biosanitari de classe III (1)

Més informació: [Com posar-se i treure's els EPI en cas de sospita de coronavirus SARS-CoV-2. Canal Salut](#)